

むし歯予防にフッ素がお役立ち

Check-Up

junior kodomo gel

フッ素高滞留処方



製品情報
はこちら



ATTENTION

子どもの歯は
むし歯になっても
生え変わるから
平気かな？

歯並びを
悪くする原因に！

むし歯になったら
歯医者さんで
治療してもらえば
大丈夫？

削った歯は二度と
元の状態に戻りません！



毎食後に



ソフトペースト

お子様のむし歯予防にフッ素配合のハミガキ

kodomo

junior

500ppmF

950ppmF

1450ppmF



ぶどう

グレープ

ストロベリー

アップル

シャイン
マスカット

販売名 (左から) : チェック・アップkodomo Da, チェック・アップkodomo Ca, チェック・アップkodomo Cb, チェック・アップkodomo Cc, チェック・アップjunior Aa

gel

フッ素が歯面に滞留するジェルタイプ

1450ppmF

就寝前に



無研磨ジェル

500ppmF

950ppmF



バナナ

グレープ

ピーチ

オレンジソーダ

販売名 (左から) : チェック・アップGxDa, チェック・アップGyBa, チェック・アップGyBb, チェック・アップGzBb

●フッ素高濃度配合品(1450ppmF)の6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。

【注意】

●発疹などの異常が現れたときは使用を中止し、医師に相談してください。●歯科医師・歯科衛生士の指導のもとにお使いください。●食物や薬などによりアレルギー様症状を起こしたことがあるお子様や喘息のお子様は特に注意してください。


歯並びを悪くする原因に！

✖ 子どもの歯がむし歯になり
早い段階で抜けてしまった場合

最初に生える6歳臼歯が
傾いて生えてしまう



○ 自然な生え変わりの
場合



歯は皮膚や骨と違い、元の状態に再生できない組織です

むし歯の治療では、歯を削った部分を詰め物などの人工物で補います。



治療した部分は、時間がたつと詰め物と歯の境目に汚れがたまりやすく、むし歯が再発しやすくなってしまいます。



むし歯をくり返すほど、歯は少しずつ削られていき、歯の寿命も縮まり、抜歯が必要になってしまうことも

痛くなってから歯医者さんに行くのではなく、むし歯になる前の定期健診が大切です。

いくつ当てはまりますか？
子どものむし歯リスク



みがき残しが増える

乳歯と永久歯が混在

仕上げみがき卒業

忙しくて歯みがきは後回し

生活習慣・食生活の変化

部活などで清涼飲料水を飲む機会が増える

間食の増加


お子様の将来の歯を守ろう！

むし歯予防にフッ素が役立ち

フッ素の働き

1

歯を強くする



2

むし歯菌の働きを弱める



3

再石灰化を促進する



フッ素を十分働かせるには、お口の中に長く残ることが大切です

ライオン独自技術

フッ素高滞留処方

Check-Up
gel kodomo junior

フッ素滞留性が約3倍に

*当社旧製品との比較において

